

¿Desea aprender sobre Ozempic®?

AQUÍ TIENE ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDE HACERLE A SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA



La diabetes cambia con el tiempo y es posible que tenga que hacer ajustes a su alimentación y a su rutina de ejercicio. Su medicamento también puede cambiar, así que use esta guía para hablar con su médico sobre sus necesidades actuales y aprenda más sobre Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg or 1 mg, un medicamento inyectable de venta con receta para adultos con diabetes tipo 2.

Asegúrese de imprimir y llevar estas preguntas con usted. Podrían ayudarle a guiar su conversación para aprovechar al máximo su cita.

- ¿En qué se diferencia Ozempic® de los medicamentos para la diabetes que estoy usando actualmente?
- ¿Reemplazaría Ozempic® los medicamentos que estoy usando actualmente?
- ¿Qué sucede si no me agradan las inyecciones?
- ¿Puede un medicamento de una vez por semana controlar el azúcar en la sangre durante toda la semana?
- ¿Puede Ozempic® ayudarme a lograr mi objetivo de A1C?
- ¿Afectaría mi peso el uso de Ozempic®?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®?
- ¿Es Ozempic® adecuado para mí?

Preguntas adicionales _____

¿Qué es Ozempic®?

Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg or 1 mg, es un medicamento inyectable de venta con receta usado:

- junto con una dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2;
- para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios tales como ataque cardíaco, ataque cerebral o la muerte en adultos que padecen diabetes mellitus tipo 2 con enfermedades cardíacas confirmadas.

Se desconoce si Ozempic® se puede usar en personas que han tenido pancreatitis.

Ozempic® no es un sustituto de la insulina y no es para usar en personas con diabetes tipo 1 ni en personas con cetoacidosis diabética.

Se desconoce si el uso de Ozempic® es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

Información importante sobre la seguridad

No comparta su pluma de Ozempic® con otras personas, aunque se haya cambiado la aguja. Puede contagiar una infección grave a otra persona o se la pueden contagiar a usted.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic®?

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Dígale a su proveedor de atención médica si le sale un bulto o tiene hinchazón en el cuello, tiene ronquera, dificultad para tragar o le falta el aire. Podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios realizados con roedores, Ozempic® y otros medicamentos que actúan como Ozempic® causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. No se sabe si Ozempic® causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.
- No utilice Ozempic® si usted o un familiar ha tenido carcinoma medular de tiroides o una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

La información importante sobre la seguridad continúa en la página siguiente.

Click here for [Prescribing Information](#) and [Medication Guide](#) in English, o

haga clic aquí para obtener [Información de Prescripción](#) y [Guía de Medicamentos](#) en español.

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg/1mg

Información importante sobre la seguridad (continúa)

No use Ozempic[®] si:

- usted o un familiar ha tenido carcinoma medular de tiroides o síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2.
- es alérgico a semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic[®].

Antes de usar Ozempic[®], informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna otra afección médica, incluso lo siguiente:

- tiene o ha tenido problemas de páncreas o renales.
- tiene antecedentes de retinopatía diabética.
- está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si Ozempic[®] puede dañar a su bebé en gestación o si pasa a la leche materna. Si planea quedar embarazada, debe dejar de usar Ozempic[®] 2 meses antes de quedar embarazada.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, tanto de venta con receta como de venta libre, vitaminas, suplementos de hierbas y otros medicamentos para tratar la diabetes, incluso insulina y sulfonilureas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic[®]?

Ozempic[®] puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deje de usar Ozempic[®] y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda.
- **cambios en la vista.** Informe a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic[®].
- **nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Su riesgo de que le baje el azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic[®] junto con otro medicamento que pueda hacer que le baje el azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina.

Los signos y síntomas del azúcar en la sangre baja pueden incluir: mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.

- **problemas renales (insuficiencia renal).** En las personas que tienen problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede hacer que los problemas renales empeoren. Es importante que beba líquidos para disminuir la probabilidad de deshidratarse.
- **reacciones alérgicas graves.** Deje de usar Ozempic[®] y solicite atención médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como picazón, sarpullido o dificultad para respirar.

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic[®] pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

Click here for [Prescribing Information](#) and [Medication Guide](#) in English, o haga clic aquí para obtener [Información de Prescripción](#) y [Guía de Medicamentos](#) en español.

Ozempic[®] es un medicamento recetado.

Se recomienda que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados.

Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al **1-800-FDA-1088**.